

別表 1（第 5 条関係）

1 検査依頼書（A）に添える試料の量

（1）発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査

種 類	検査事項別提供試料の最小限重量			
	発芽 g	純潔度合 g	含水量 g	異種の粒数 g
セロリー、ベントグラス、ローズグラス、チモシー、レッドトップ、 ケンタッキーブルーグラス、しば	1	2	50	10
しろクローバー	2	4	50	20
にんじん、みつば、レタス、オーチャードグラス、リードカナリーグラス	5	10	50	30
からしな、パセリ	5	10	50	40
ねぎ、あかクローバー、トールフェスク	5	10	50	50
ペレニアルライグラス	10	20	50	60
かぶ、トマト、はくさい、リーキ、パヒアグラス	10	20	50	70
ひえ、しゅんぎく、たまねぎ	10	20	50	80
あわ	10	20	50	90
なたね、カリフラワー、キャベツ、コールラビー、在来なたね、にら、 ブロッコリー、めキャベツ	10	20	50	100
なす、とうがらし	15	30	50	150
ごぼう、ほうれんそう	25	50	50	250
だいこん	50	100	50	300
稲	70	100	100	700
てんさい	50	100	50	500
そば	60	120	100	600
きゅうり、メロン	70	150	50	700
アスパラガス	100	200	50	1,000
大麦、小麦、緑豆	120	250	100	1,000
小豆、すいか	250	500	100	1,000
かぼちゃ、ゆうがお	500	1,000	50	1,000
大豆、とうもろこし、いんげんまめ、えんどう、そらまめ（一寸を除く。）	500	1,000	100	1,000
そらまめ（一寸）	2,000	2,000	100	2,000
上記各欄に掲げるもの以外の農作物種子	当該種子の大きさにより上記各欄に 掲げる量に準じた量			

(備考)

- 1) 検査を依頼するために提供する試料の重量は、それぞれの検査事項についての「試料の最小限重量」の合計量とすること。ただし、発芽及び純潔度合の2事項についての検査を依頼する場合における試料の重量は、純潔度合の試料の重量とすること。発芽、純潔度合及び含水量の3事項についての検査を依頼する場合における試料の重量は、純潔度合及び含水量の試料の重量の合計量とすること。異種の粒数及び他の事項(含水量を除く。)についての検査を依頼する場合における試料の重量は、異種の粒数の重量とすること。「上記各欄に掲げるもの以外の農作物種子」の試料の重量は、個別に問い合わせること。
- 2) 含水量の検査を依頼するために提供する試料は、防湿包装容器に入れ、シーリング等で確実に密封すること。

(2) 提供試料が被覆種子の場合の検査

ペレットシード

検査項目	送付試料の最小限数量 (粒)
純潔度合検査 (種の検証を含む)	2, 500
発芽試験	2, 500
異種の粒数検査	10, 000
異種の粒数検査 (エンクラストシード及びシードグラニュール)	25, 000

シードテープ

検査項目	送付試料の最小限数量 (粒)
発芽試験	2, 000
異種の粒数検査	10, 000

(3) 病害検査

種 類	病原体名	病害名	提供試料の 最小限数量
ニンジン	<i>Alternaria radicina</i>	黒斑病	425粒
ニンジン	<i>Alternaria dauci</i>	黒葉枯病	425粒
ニンジン	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	斑点細菌病	10, 025粒
ユウガオ	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lagenariae</i>	つる割病	425粒
インゲンマメ	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	炭疽病	425粒
エンドウ	<i>Ascochyta pisi</i>	褐斑病及び褐紋病	425粒
	<i>Didymella pinodes</i> (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)		
エンドウ	<i>Pea seed-borne mosaic virus</i>	モザイク病	2, 025粒
アブラナ属野菜	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> 洗浄液培養法及び磨砕液培養法 Seed Wash-PCR 法	黒腐病	30, 025粒 10, 025粒
アブラナ属野菜	<i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	根朽病	425粒又は 1, 025粒
アブラナ属野菜	<i>Alternaria brassicicola</i>	黒すす病	425粒
アブラナ属野菜	<i>Alternaria brassicae</i>	黒斑病	425粒
アブラナ属野菜	<i>Alternaria japonica</i>	黒斑病	425粒
アブラナ属野菜	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i>	黒斑細菌病	30, 025粒
ダイコン	<i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	(和名無)	425粒
ダイコン	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> 洗浄液培養法 Seed Wash-PCR 法	黒腐病	30, 025粒 10, 025粒
ダイコン	<i>Alternaria brassicicola</i>	黒斑病	425粒
ダイコン	<i>Alternaria brassicae</i>	黒斑病	425粒
ダイコン	<i>Alternaria japonica</i>	黒斑病	425粒
ダイコン	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i>	黒斑細菌病	30, 025粒
トマト	Tobamoviruses (<i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tobacco mosaic virus</i> , <i>Pepper mild mottle virus</i> , <i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)	モザイク病	3, 025粒
トマト・ナス	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> 洗浄液培養法及び Seed Wash-PCR 法	かいよう病	10, 025粒
トマト・ナス	<i>Xanthomonas</i> 属 2 種 洗浄液培養法及び Seed Wash-PCR 法	斑点細菌病	10, 025粒
レタス	<i>Lettuce mosaic virus</i>	モザイク病	3, 025粒
ウリ科野菜	<i>Kyuri green mottle mosaic virus</i>	緑斑モザイク病	2, 025粒又は 9, 425粒
ウリ科野菜	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	緑斑モザイク病	2, 025粒又は 9, 425粒
ウリ科野菜	<i>Squash mosaic virus</i>	スカッシュモザイク病	2, 025粒又は 9, 425粒
ウリ科野菜	<i>Melon necrotic spot virus</i>	メロンえそ斑点病	2, 025粒又は 9, 425粒
ウリ科野菜	<i>Paracidovorax citrulli</i> (<i>Acidovorax citrulli</i>)	果実汚斑細菌病	10, 025粒
トウガラシ	Tobamoviruses (<i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tobacco mosaic</i>	モザイク病	3, 025粒

カボチャ	<i>virus, Pepper mild mottle virus)</i>		
カボチャ	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	果実斑点細菌病	10,025粒
	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	つる枯病	425粒
	<i>(Didymella bryoniae)</i>		

(備考)

- 1) 病害の検査を依頼するために提出する試料は、汚染防止のため、適当な容器又は資材で他の検査事項用の提供試料とは別に包装すること。
- 2) (1)の発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査を併せて依頼する場合における提供試料の量は、(1)の試料の重量及び病害検査の試料の数量の合計量とすること。
- 3) ニンジンについて、同一試料で *Alternaria radicina* (黒斑病) と *Alternaria dauci* (黒葉枯病) の両方の検査を依頼する場合の提供試料の最小限数量は、425粒とする。
- 4) アブラナ属野菜について、同一試料で *Alternaria brassicicola* (黒すす病) と *Alternaria brassicae* (黒斑病) と *Alternaria japonica* (黒斑病) のうち、いずれか2病原体又は3病原体を検査する場合の提供試料の最小限数量は、425粒とする。また、これらの組合せ又はいずれかの1病原体と *Plenodomus lingam* (*Leptosphaeria maculans*, 根朽病) との検査を組み合わせる場合の提供試料の最小限数量は、825粒又は1,425粒とする。
- 5) ダイコンについて、同一試料で *Alternaria brassicicola* (黒斑病) と *Alternaria brassicae* (黒斑病) と *Alternaria japonica* (黒斑病) のうち、いずれか2病原体又は3病原体を検査する場合の提供試料の最小限数量は、425粒とする。また、これらの組合せ又はいずれかの1病原体と *Plenodomus lingam* (*Leptosphaeria maculans*) の検査を組み合わせる場合の提供試料の最小限数量は、825粒とする。
- 6) 提出できる数量が最小限数量に満たない場合は、要相談とする。

2 検査依頼書（B）に添える試料の量

（１）発芽、純潔度合、異種の粒数及び含水量の検査
農作物、野菜、花卉、香辛料及び薬用植物の種子

種 類		荷口の 最大限 重量	試料の最小限重量			
			送付 試料	純潔 検査	異種の 粒数検査	含水量 検査
			g	g	g	g
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	オクラ	20, 000	1, 000	140	1, 000	N/A
<i>Achillea umbellata</i> Sm.	アキレア・ウンベルラータ	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	アゲラタム	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Agrostis capillaris</i> L.	コロニアルベントグ래스	10, 000	5	0. 25	2. 5	50
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	レットトップ	10, 000	5	0. 25	2. 5	50
<i>Agrostis stolonifera</i> L. (<i>A. palustris</i> Hudson を含む)	クリーピングベントグ래스	10, 000	5	0. 25	2. 5	50
<i>Allium cepa</i> L.	タマネギ	10, 000	80	8	80	50
<i>Allium fistulosum</i> L.	ネギ	10, 000	50	5	50	50
<i>Allium porrum</i> L.	リーキ	10, 000	70	7	70	50
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	チャイブ、アサツキ、エゾネギ	10, 000	30	3	30	50
<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	ニラ	10, 000	100	10	100	50
<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	アリスクロハーバー	10, 000	40	4	40	N/A
<i>Antirrhinum majus</i> L.	キンギョソウ	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Apium graveolens</i> L.	セロリー	10, 000	10	1	10	50
<i>Arachis hypogaea</i> L.	ラッカセイ	30, 000	1, 000	1, 000	1, 000	N/A
<i>Arctium lappa</i> L.	ゴボウ	10, 000	50	5	50	N/A
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	トールオートグ래스	10, 000	80	8	80	50
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	ヨモギ	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Asparagus officinalis</i> L.	アスパラガス	20, 000	1, 000	100	1, 000	50
<i>Aster alpinus</i> L.		5, 000	20	5	-	N/A
<i>Avena sativa</i> L.	エンバク	30, 000	1, 000	120	1, 000	100
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	セイヨウチャヒキ	30, 000	500	50	500	100
<i>Axonopus fissifolius</i> (Raddi) Kuhlm.	コモンカーベットグ래스	10, 000	10	1	10	N/A
<i>Bellis perennis</i> L.	ヒナギク(デージー)	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Beta vulgaris</i> L. (mono-germ varieties)	フダンソウ、ビート(テンサイ) 類(単胚種子)	20, 000	500	30	300	50
<i>Beta vulgaris</i> L. (multi-germ varieties)	フダンソウ、ビート(テンサイ) 類(複胚種子)	20, 000	500	50	500	50

<i>Brassica carinata</i> A.Braun	アビシニアカブラシ	10,000	100	10	100	50
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	カラシナ類	10,000	40	4	40	50
<i>Brassica napus</i> L.	ナタネ	10,000	100	10	100	50
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.*	ルタバガ (スウェーデンカブ)	10,000	100	10	100	50
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	クロカラシ	10,000	40	4	40	50
<i>Brassica oleracea</i> L. (all varieties)	キャベツ類(全変種)	10,000	100	10	100	50
<i>Brassica rapa</i> L. (<i>B.campestris</i> L.を含む)	カブ	10,000	70	7	70	50
<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn. var. <i>marginatus</i> (Steud.) Barkworth & Anderton (旧 <i>Bromus marginatus</i> Steud.)	マウンテンブローム	10,000	200	20	200	50
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	レスクグラス(イヌムギ)	10,000	200	20	200	50
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		10,000	50	5	50	50
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	スモースブローム (スズメノチャビキ)	10,000	90	9	90	50
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	キマメ(リュウキュウマメ)	20,000	1,000	300	1,000	N/A
<i>Calendula officinalis</i> L.	キンセンカ	5,000	80	20	-	N/A
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	アスター(エゾギク)	5,000	20	6	-	N/A
<i>Campanula medium</i> L.	フウリンソウ	5,000	5	0.6	-	N/A
<i>Capsicum</i> spp.	トウガラシ属	10,000	150	15	150	50
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	ヘニハナ	25,000	900	90	900	N/A
<i>Celosia argentea</i> L.	ノゲイトウ	5,000	10	2	-	N/A
<i>Centaurea cyanus</i> L.	ヤグルマソウ(ヤグルマギク)	5,000	40	10	-	N/A
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	キノア	10,000	100	10	100	N/A
<i>Chloris gayana</i> Kunth	ローズググラス	10,000	10	1	10	50
<i>Cicer arietinum</i> L.	ヒヨコマメ	30,000	1,000	1,000	1,000	100
<i>Cichorium endivia</i> L.	エンダーイブ	10,000	40	4	40	50
<i>Cichorium intybus</i> L.	チコリー	10,000	50	5	50	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	スイカ	20,000	1,000	250	1,000	100
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ハトムギ	5,000	600	150	-	N/A
<i>Convolvulus tricolor</i> L.	サンシキアサガオ	5,000	100	25	-	N/A
<i>Corchorus capsularis</i> L.	ジュート(コウマ)	10,000	150	15	150	N/A
<i>Corchorus olitorius</i> L.	モロヘイヤ(タイワンツナソ)	10,000	150	15	150	N/A
<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake (<i>C. drummondii</i> (D.Don) Torr. & A.Gray を含む)	キンケイギク	5,000	20	5	-	N/A
<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	オオキンケイギク	5,000	20	5	-	N/A
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	ハルシヤギク	5,000	5	1	-	N/A

<i>Coriandrum sativum</i> L.	コリアンダー(コエントロー)	10,000	400	40	400	N/A
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	コスモス	5,000	80	20	-	N/A
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	キバナコスモス	5,000	80	20	-	N/A
<i>Crotalaria brevidens</i> Benth. (<i>Crotalaria intermedia</i> Kotschy を含む)	クロタリア	10,000	150	15	150	N/A
<i>Cucumis</i> spp.	キュウリ属	10,000	150	70	-	50
<i>Cucumis melo</i> L.	メロン	10,000	150	70	-	50
<i>Cucumis sativus</i> L.	キュウリ	10,000	150	70	-	50
<i>Cucurbita</i> spp.	カボチャ属	10,000	350	180	-	50
<i>Cucurbita hybrids</i>		10,000	350	180	-	50
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	セイヨウカボチャ	20,000	1,000	700	1,000	50
<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	ニホンカボチャ	10,000	350	180	-	50
<i>Cucurbita pepo</i> L.	ペポカボチャ	20,000	1,000	700	1,000	50
<i>Cuminum cyminum</i> L.	クミン	10,000	60	6	60	50
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	シクラメン	5,000	100	30	-	N/A
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	ハローニータグラス (キョウキシハ)	10,000	10	1	10	50
<i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & J.R.Drumm.	シノグロッサム	5,000	40	10	-	N/A
<i>Dactylis glomerata</i> L.	オーチャードグラス(カモグサ)	10,000	30	3	30	50
<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	(タリア)テンジクホタン	5,000	80	20	-	N/A
<i>Daucus carota</i> L.	ニンジン	10,000	30	3	30	50
<i>Delphinium</i> × <i>belladonna</i> hort. ex Bergmans	デルフィニウムベラドンナ	5,000	20	4	-	N/A
<i>Delphinium</i> × <i>cultorum</i> Voss	デルフィニウム	5,000	20	4	-	N/A
<i>Dianthus barbatus</i> L.	ヒゲナデシコ(アメリカナデシコ)	5,000	10	3	-	N/A
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	カーネーション	5,000	20	5	-	N/A
<i>Dianthus chinensis</i> L.	セキチク	5,000	10	3	-	N/A
<i>Dianthus deltoides</i> L.	ヒメナデシコ	5,000	20	0.5	-	N/A
<i>Dianthus plumarius</i> L.	タツタナデシコ	5,000	20	5	-	N/A
<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	デイクントラ(アオイコケ)	10,000	50	5	50	N/A
<i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC. (旧 <i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.)	オステオスヘルマム	5,000	40	10	-	N/A
<i>Dimorphotheca pluvialis</i> (L.) Moench	アフリカキンセンカ	5,000	40	10	-	N/A
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	ヒエ	10,000	80	8	80	N/A
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees	ウイピーングラフグラス	10,000	10	1	10	N/A
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	ウォールフラワー	5,000	10	3	-	N/A
<i>Erysimum</i> × <i>marshallii</i> (Henfr.) Bois	チェランサス	5,000	10	3	-	N/A

<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	ハナヒ [○] シソウ (カリフォルニアボ [○] ヒ [○] ー)	5, 000	20	5	-	N/A
<i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Salisb. ex G.Don	ユーストマ エク [○] サ [○] ルタウム	5, 000	5	0. 2	-	N/A
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	ソバ [○]	10, 000	600	60	600	100
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	トールフェスク (オウシノケ [○] サ)	10, 000	50	5	50	50
<i>Festuca ovina</i> L. (all varieties)	シーブ [○] フェスク (ウシノケ [○] サ) (全変種)	10, 000	25	2. 5	25	50
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	メド [○] ウフェスク (ヒロハノウシノケ [○] サ)	10, 000	50	5	50	50
<i>Festuca rubra</i> L. s.l. (all varieties)	レッド [○] フェスク (オウシノケ [○] サ) (全変種)	10, 000	30	3	30	50
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	フェンネル (ウイキョウ)	10, 000	180	18	180	N/A
<i>Fragaria</i> spp.	オランダ [○] イチゴ [○] 属	10, 000	10	1	10	N/A
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	オオテンニンギ [○] ク	5, 000	30	8	-	N/A
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	テンニンギ [○] ク	5, 000	20	6	-	N/A
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	ガ [○] サ [○] ニア	5, 000	20	5	-	N/A
<i>Gentiana acaulis</i> L.	チヤボ [○] リント [○] ウ	5, 000	5	0. 7	-	N/A
<i>Gerbera jamesonii</i> Adlam	ガ [○] ーベ [○] ラ	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach	シュンギ [○] ク	5, 000	30	8	-	N/A
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	アラゲ [○] シュンギ [○] ク	5, 000	30	8	-	N/A
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	タ [○] イ [○] ズ	30, 000	1, 000	500	1, 000	100
<i>Gomphrena globosa</i> L.	セニチコウ	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Gypsophila elegans</i> M.Bieb.	カスミソウ	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	シュツコンカスミソウ	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Gypsophila repens</i> L.	ヒメイワガ [○] スミ	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Helianthus annuus</i> L.	ヒマワリ	25, 000	1, 000	200	1, 000	50
<i>Helianthus debilis</i> Nutt.	ヒメヒマワリ	10, 000	150	40	-	N/A
<i>Hibiscus trionum</i> L.	ギ [○] ンセンカ	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (旧 <i>Hordeum vulgare</i> L.)	オムキ [○]	30, 000	1, 000	120	1, 000	100
<i>Iberis umbellata</i> L.	キャンテ [○] イタフト	5, 000	10	3	-	N/A
<i>Impatiens balsamina</i> L.	ホウセンカ	5, 000	100	25	-	N/A
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	インバ [○] チェンス (アフリカホウセンカ)	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Ipomoea alba</i> L.	ヨルガ [○] オ	10, 000	400	100	-	N/A
<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	エンサイ (ヨウサイ、カンコン)	20, 000	1, 000	100	1, 000	N/A
<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.	ソライロアサガ [○] オ (セイヨウアサガ [○] オ)	10, 000	400	100	-	N/A
<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	フジ [○] マメ	20, 000	1, 000	600	1, 000	N/A

<i>Lactuca sativa</i> L.	レタス	10, 000	30	3	30	50
<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	ヒョウタン、ユウガ ^オ	20, 000	1, 000	500	1, 000	N/A
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	スイートピー	10, 000	600	150	-	100
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	ラベンダー	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Lavatera trimestris</i> L.	ラハ ^テ ラ (ハナアオイ)	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Lespedeza juncea</i> (L. f.) Pers.	カラメト ^{ハキ}	10, 000	30	3	30	N/A
<i>Linum grandiflorum</i> Desf.	ヘ ^ニ ハ ^ナ アマ	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Linum usitatissimum</i> L.	アマ	10, 000	150	15	150	50
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	スイートアリッサム (ニワナス ^ナ)	5, 000	5	1	-	N/A
<i>Lolium</i> × <i>hybridum</i> Hausskn.		10, 000	60	6	60	50
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	イタリアンライグ ^{ラス} (ネス ^ミ キ ^ミ)	10, 000	60	6	60	50
<i>Lolium perenne</i> L.	ペ ^レ ニア ^ル ライグ ^{ラス} (ホソムキ ^ミ)	10, 000	60	6	60	50
<i>Lotus corniculatus</i> L.	ハ ^{ース} フット ^レ フォイル	10, 000	30	3	30	50
<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	ヘチマ	20, 000	1, 000	250	1, 000	N/A
<i>Lupinus hybrids</i>	ルビ ^{ナス}	10, 000	200	60	-	N/A
<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	ワシントンルビ ^{ナス} (シュツコンルビ ^{ナス})	10, 000	200	60	-	N/A
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb. (旧 <i>Anagallis arvensis</i> L.)	ルリハコベ ^ミ	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Matthiola incana</i> (L.) W.T.Aiton	ストック (アラセイトウ)	5, 000	20	4	-	N/A
<i>Matthiola longipetala</i> (Vent.) DC.	イブ ^{ニン} グ ^{ストック}	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Medicago sativa</i> L.	アルファルファ (ムラサキウマコ ^ギ シ)	10, 000	50	5	50	50
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs (旧 <i>Panicum maximum</i> Jacq.)	キ ^{ニア} グ ^{ラス}	10, 000	20	2	20	50
<i>Momordica charantia</i> L.	ツレイシ (ニガ ^ウ リ)	20, 000	1, 000	450	1, 000	N/A
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton	クレソン (ウォータークレス)	10, 000	5	0. 5	5	N/A
<i>Nemophila maculata</i> Benth. ex Lindl	ネモフィラ・マクラータ	5, 000	20	5	-	N/A
<i>Nemophila menziesii</i> Hook. & Arn.	ネモフィラ・メンジ ^エ シー	5, 000	20	5	-	N/A
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	タバ ^コ	10, 000	5	0. 5	5	50
<i>Nierembergia hippomanica</i> Miers	ニールンベ ^ル キ ^ア	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Nigella damascena</i> L.	クロタネツク	5, 000	20	6	-	N/A
<i>Ocimum basilicum</i> L.	バ ^シ ル (バ ^コ ウキ)	10, 000	40	4	40	N/A
<i>Origanum majorana</i> L.	マ ^ジ ョラム (マヨ ^ラ ナ)	10, 000	5	0. 5	5	N/A
<i>Origanum vulgare</i> L.	オレガ ^ノ (ハナハッカ)	10, 000	5	0. 5	5	N/A
<i>Oryza sativa</i> L.	イネ	30, 000	700	70	700	100
<i>Panicum miliaceum</i> L.	キビ ^ミ	10, 000	150	15	150	50

<i>Papaver nudicaule</i> L.	アイランド ^ホ ビ ^ー	5,000	5	0.5	-	N/A
<i>Papaver orientale</i> L.	オリエンタル ^ホ ビ ^ー (オニゲ ^シ)	5,000	5	1	-	N/A
<i>Papaver rhoeas</i> L.	ヒナゲ ^シ	5,000	5	0.5	-	N/A
<i>Paspalum notatum</i> Flügge	パ ^ビ アグ ^ラ ス (キシウスス ^{メノ} ヒエ)	10,000	70	7	70	50
<i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov.	キクユ ^ラ ス	10,000	70	7	70	N/A
<i>Pericallis cruenta</i> (Masson ex L' Hér.) Bolle	シネリア	5,000	5	0.5	-	N/A
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	シソ	5,000	10	3	-	N/A
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	パ ^セ リ	10,000	40	4	40	50
<i>Petunia × atkinsiana</i> (Sweet) D.Don ex W.H.Baxter	ペ ^{チュ} ニア	5,000	5	0.2	-	N/A
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	ハセ ^リ ソウ	10,000	50	5	50	50
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	リート ^{カナ} リーク ^ラ ス (クサヨシ)	10,000	30	3	30	50
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	ベ ^ニ ハ ^ナ インゲ ^ン	30,000	1,000	1,000	1,000	100
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	インゲ ^ン	30,000	1,000	700	1,000	100
<i>Phleum pratense</i> L.	チモシー (オオアワカ ^エ リ)	10,000	10	1	10	50
<i>Phlox drummondii</i> Hook.	フロックス	5,000	20	5	-	N/A
<i>Physalis alkekengi</i> L.	ホオズ ^キ	5,000	20	4	-	N/A
<i>Physalis pubescens</i> L.	食用ホオズ ^キ (Barbados Gooseberry)	10,000	20	2	20	N/A
<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	エンド ^ウ	30,000	1,000	900	1,000	100
<i>Plectocephalus americana</i> (Nutt.) D.Don	アザ ^ミ ヤク ^ル マ	5,000	100	35	-	N/A
<i>Plectranthus scutellarioides</i> (L.) R.Br.	(コリウス) キンランシ ^ソ	5,000	10	2	-	N/A
<i>Poa annua</i> L.	スス ^{メノ} カタビ ^ラ (Annual Bluegrass)	10,000	10	1	10	50
<i>Poa pratensis</i> L.	ケンタッキー ^{ブル} グ ^ラ ス (ナカ ^ハ グ ^サ)	10,000	5	1	5	50
<i>Poa trivialis</i> L.	オオスス ^{メノ} カタビ ^ラ (Rough Bluegrass)	10,000	5	1	5	50
<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	マツバ ^ホ タン	5,000	5	0.3	-	N/A
<i>Portulaca oleracea</i> L.	スベ ^リ ヒユ	10,000	5	0.5	5	N/A
<i>Primula auricula</i> L.	プ ^リ ムラ ^{オー} リカラ (アツバ ^サ クラソウ)	5,000	5	1	-	N/A
<i>Primula denticulata</i> Sm.	プ ^リ ムラ ^{テン} ティクラータ (タマザ ^キ クラソウ)	5,000	5	0.5	-	N/A
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	プ ^リ ムラ ^{エラ} チオール	5,000	10	2	-	N/A
<i>Primula japonica</i> A.Gray	クリソウ	5,000	5	1	-	N/A
<i>Primula × kewensis</i> W.Watson	プ ^リ ムラ ^{キュー} エンシス (ヤク ^ラ ザ ^ク ラ)	5,000	5	0.5	-	N/A

<i>Primula malacoides</i> Franch.	プ リムラ・マラコイデ ス (ケショウサ クラ)	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Primula obconica</i> Hance	プ リムラ・オブ コニカ (トキワサ クラ)	5, 000	5	0. 5	-	N/A
<i>Primula praenitens</i> Ker Gawl.	チュウカサクラソウ (カンサ クラ)	5, 000	5	1	-	N/A
<i>Primula veris</i> L.	キハ ナノクリンサ クラ	5, 000	5	1	-	N/A
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	イチゲ サクラソウ	5, 000	5	1	-	N/A
<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.	シカクマメ (トウサイ)	20, 000	1, 000	1, 000	1, 000	N/A
<i>Raphanus sativus</i> L.	ダ イコン	10, 000	300	30	300	50
<i>Rudbeckia hirta</i> L.	ルド ヒキア	5, 000	5	1	-	N/A
<i>Saintpaulia ionantha</i> H.Wendl.	セントポ ーリア (アフリカスミレ)	5, 000	5	0. 1	-	N/A
<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.	ヘニハ ナサルビ ア	5, 000	30	8	-	N/A
<i>Salvia farinacea</i> Benth.	プ ルーサルビ ア	5, 000	20	5	-	N/A
<i>Salvia hispanica</i> L.	チア	10, 000	35	3. 5	35	N/A
<i>Salvia officinalis</i> L.	セージ	5, 000	30	20	-	N/A
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Nees	サルビ ア	5, 000	30	8	-	N/A
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	オランダ ワレモコウ (Little Burnet)	10, 000	250	25	250	N/A
<i>Secale cereale</i> L.	ライムキ	30, 000	1, 000	120	1, 000	100
<i>Sesamum indicum</i> L.	ゴ マ	10, 000	70	7	70	50
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	アワ	10, 000	90	9	90	50
<i>Silene pendula</i> L.	オオマンテマ (フクロナデ シコ)	5, 000	10	2	-	N/A
<i>Sinapis alba</i> L.	シロカ ラシ	10, 000	200	20	200	50
<i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) spp.		200	15	7	-	50
<i>Solanum</i> (sect. <i>Lycopersicon</i>) hybrids		200	15	7	-	50
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	トマト	200	15	7	-	50
<i>Solanum melongena</i> L.	ナス	10, 000	150	15	150	50
<i>Solanum nigrum</i> L.	イヌホオズ キ	10, 000	25	2. 5	25	N/A
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> (旧 <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	ソルガ ム (モロコシ)	30, 000	900	90	900	100
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse (旧 <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	スーダ ンガ ラス	10, 000	250	25	250	100
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>S.sudanense</i> (Piper) Stapf		30, 000	300	30	300	100
<i>Spinacia oleracea</i> L.	ホウレンソウ	10, 000	250	25	250	50
<i>Tagetes erecta</i> L.	アフリカンマリーゴ ールト	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Tagetes patula</i> L.	フレンチマリーゴ ールト	5, 000	40	10	-	N/A
<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	メキシカンマリーゴ ールト	5, 000	20	5	-	N/A

<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., s.l.	ショクヨウタンポポ	10,000	30	3	30	N/A
<i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D.R.Dewey (旧 <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski)	インターメデキエイトホイトグラス	10,000	150	15	150	N/A
<i>Thymus serpyllum</i> L.	タイム	5,000	5	0.5	-	N/A
<i>Thymus vulgaris</i> L.	タイム(タチシヤコウソウ)	10,000	5	0.5	5	N/A
<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	トレニア	5,000	5	0.2	-	N/A
<i>Trifolium hybridum</i> L.	アルサイクローパー	10,000	20	2	20	50
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	クリムソンクローパー	10,000	80	8	80	50
<i>Trifolium pratense</i> L.	アカクローパー	10,000	50	5	50	50
<i>Trifolium repens</i> L.	シロクローパー	10,000	20	2	20	50
× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A.Camus	ライコムギ	30,000	1,000	120	1,000	100
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i> (旧 <i>Triticum aestivum</i> L.)	コムギ	30,000	1,000	120	1,000	100
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell. (旧 <i>Triticum spelta</i> L.)	スペルトコムギ	30,000	1,000	270	1,000	100
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>dicoccon</i> (Schränk) Thell. (旧 <i>Triticum dicoccon</i> Schrank)	エンマーコムギ	30,000	1,000	270	1,000	100
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren (旧 <i>Triticum durum</i> Desf.)	デュラムコムギ(マカロニコムギ)	30,000	1,000	120	1,000	100
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	トウカンソウ	5,000	20	5	-	N/A
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	コーンサラダ(ノチシヤ)	10,000	70	7	70	50
<i>Vicia faba</i> L.	ソラマメ	30,000	1,000	1,000	1,000	100
<i>Vicia narbonensis</i> L.	ナルボソナベツチ	30,000	1,000	600	1,000	100
<i>Vicia sativa</i> L. (<i>V.angustifolia</i> L.を含む)	コモンソナベツチ(ナローリーフソナベツチを含む)	30,000	1,000	140	1,000	100
<i>Vicia villosa</i> Roth (<i>V. dasycarpa</i> Ten.を含む)	ヘアリーベツチ(ウーリーボットソナベツチを含む)	30,000	1,000	100	1,000	100
<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H.Ohashi	アズキ	30,000	1,000	250	1,000	100
<i>Vigna radiata</i> (L.) R.Wilczek	リョクトウ	30,000	1,000	120	1,000	100
<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ササゲ	30,000	1,000	400	1,000	100
<i>Vinca minor</i> L.	ヒメツルニチニチソウ	5,000	20	5	-	N/A
<i>Viola odorata</i> L.	ニオイスミレ	5,000	10	3	-	N/A
<i>Viola tricolor</i> L.	パンジー	5,000	10	3	-	N/A
<i>Zea mays</i> L.	トウモロコシ	40,000	1,000	900	1,000	100
<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	ヒヤクニチソウ(ジニア)	5,000	80	20	-	N/A
<i>Zoysia japonica</i> Steud.	バシバ	10,000	10	1	10	N/A

(備考)

- 1) 上記表で「N/A」と記載されている検査については、検査を行わない。また、上記表で「-」と記載されている検査の試料の重量は、個別に問い合わせること。また、上記表に記載のない種類については、検査の可否を個別に問い合わせること。
- 2) 提供する試料の重量は「試料の最小限重量」以上とする。ただし、異種の粒数検査が含まれていない場合は、試料の重量は少なくとも「純潔検査の最小限重量」以上とする。
- 3) 含水量の検査を依頼するために提供する試料は、防湿包装容器に入れ、シーリング等で確実に密封すること。

(2) 提供試料が被覆種子の場合の検査

ペレットシード

検査項目	送付試料の最小限数量 (粒)
純潔度合検査 (種の検証を含む。)	2,500
純潔度合検査 (追加検査)	2,500
発芽試験	2,500
異種の粒数検査	10,000
異種の粒数検査 (エンクラストシード及びシードグラニュール)	25,000

シードテープ

検査項目	送付試料の最小限数量 (粒)
純潔度合検査 (種の検証)	300
純潔度合検査 (追加検査)	2,500
発芽試験	2,000
異種の粒数検査	10,000

(備考)

純潔度合検査 (追加検査) とは、被覆材を除いた種子に対して行う純潔度合検査のことをいう。

(3) 病害検査

種 類	病原体名	病害名	提供試料の 最小限数量
ニンジン	<i>Alternaria radicina</i>	黒斑病	425粒
ニンジン	<i>Alternaria dauci</i>	黒葉枯病	425粒
ニンジン	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	斑点細菌病	10,025粒
インゲンマメ	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	炭疽病	425粒
アブラナ属野菜	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	黒腐病	30,025粒
アブラナ属野菜	<i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	根朽病	425粒又は1,025粒
ウリ科野菜	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV)	緑斑モザイク病	2,025粒又は9,425粒

(備考)

- 1) 病害の検査を依頼するために提出する試料は、汚染防止のため、適当な容器又は資材で他の検査事項用の提供試料とは別に包装すること。
- 2) (1) の発芽、純潔度合、含水量及び異種の粒数の検査を併せて依頼する場合における提供試料の量は、(1) の試料の重量及び病害検査の試料の数量の合計量とすること。
- 3) ニンジンについて、同一試料で *Alternaria radicina* と *Alternaria dauci* の両方の検査を依頼する場合の提供試料の最小限数量は、425粒とする。

3 検査依頼書（C）に添える試料の数量

放射性物質検査

試料の区分	放射性核種	提供試料の数量
種子	ヨウ素－131 セシウム－134 セシウム－137	0.7 L以上又は100 ml以上
苗、球根等（生鮮物。土付きは不可）		
土壌		

（備考）

- 1) 提供試料は、輸送中に吸湿、破碎、腐敗、異物混入及び漏出等が起こらないよう、適当な容器又は資材を用いて包装すること。
- 2) 提供可能な試料の数量が100 ml未満の場合は、相談に応じることとする。
- 3) 苗、球根等には採種用の植物体（Plant for producing seed）を含む。