

農産物機能性成分情報「サツマイモ」(機能性成分:紫サツマイモアントシアニン、カフェ酸誘導体)

品種名	部位	加工	加工形態	成分	測定試料数	単位	平均	最大	最小	標準偏差
アケムラサキ	塊根	なし		紫サツマイモアントシアニン	6	mg/100g	587.47	772.50	365.70	178.51
種子島紫	塊根	なし		紫サツマイモアントシアニン	8	mg/100g	61.12	71.70	43.70	10.37
アヤマラサキ	塊根	なし		紫サツマイモアントシアニン	16	mg/100g	444.86	618.00	304.40	86.44
コガネセンガン	葉身	なし		カフェ酸誘導体	14	mg/100g	1,303.29	1962.00	447.00	444.02
エレガントサマー	葉身	なし		カフェ酸誘導体	4	mg/100g	836.50	1358.00	347.00	423.60
高系14号	葉身	なし		カフェ酸誘導体	14	mg/100g	1,000.21	1658.00	473.00	308.61
すいおう	葉身	なし		カフェ酸誘導体	14	mg/100g	934.57	1117.00	475.00	168.80
パープルスイートロード	塊根	なし		紫サツマイモアントシアニン	16	mg/100g	160.12	225.00	73.60	42.08
ムラサキマサリ	塊根	なし		紫サツマイモアントシアニン	6	mg/100g	389.27	424.40	349.70	23.99