なぜダイコンは青くなるのか？

—包装でダイコン青変症を防ぐ—

ダイコン青変症
(切断面)

技術の特徴

- ・収穫時に品質の良かったダイコンの内部が、数日の流通中に青く変色する現象(青変症)が全国で報告され、問題となっている。発生には、品種、栽培条件、流通条件が影響する。
- ・色素前駆物質の簡易検出法を開発した(特許第6172604号)。
- ・三重大学と共同で、色素前駆物質が4-hydroxyglucobrassicin (4-OHGB)であることを解明し、従来の青色がアントシアニンである説を否定した。
- ・包装によって、袋内の酸素濃度が低くなるほど青変症の発生が遅延した。

研究の内容

青色色素前駆物質

4-hydroxyglucobrassicin

酸化的に重合して青色化
すると考えられる

ダイコンの包装
貯蔵試験

包装内の酸素濃度が低いほど、
青変症の発生が遅れた。

今後の展開

- ・青変症を起こしにくい品種、栽培条件、流通条件を明らかにする。
- ・4-OHGBの生合成経路の遺伝子発現等、生理機構を明らかにする。
- ・県の研究機関、種苗会社、食品加工会社、大学等とプロジェクト化を準備中。
- ・青変症リスク評価法を使って、品質と栽培特性に優れ、青変症にならない(色素前駆物質を持たない)新品種の育成等につなげる。

参 考

- ・特許第6172604号
- ・*J. Natural Products*, **79** (5), 1381–1387 (2016). DOI: 10.1021/acs.jnatprod.6b00121
- ・*J. Agric. Food Chem.*, **64** (35), 6745–6751(2016). DOI: 10.1021/acs.jafc.6b02103
- ・野菜茶業研究所研究報告, **15**, 29–33 (2016)

農研機構
食品研究部門

代表研究者: 永田 雅靖
所 属: 食品加工流通研究領域
食品流通システムユニット
問合わせ先: 交流チーム: 029-838-7980