

	類似疾病検査	疫学調査	臨床検査	送付用検査材料
海6 リフトバレー熱 〔法〕	① エンテロトキセミア ② 10 ブルータング ③ ウエッセルスブロン病 ④ 20 牛流行熱 ⑤ 4・159 ブルセラ病 ⑥ ビブリオ病 ⑦ 27 トリコモナス病 ⑧ 海19 ナイロビ羊病 ⑨ 海22 流行性羊流産 ⑩ 23 レプトスピラ症	①めん羊、山羊、牛および人が感染する人獣共通感染症 ②アフリカで大雨の後で発生する傾向がある地方流行病 ③ベクターは蚊。蚊は介卵感染 ④吸血昆虫のほか、感染動物の体液を介しても接触、空気感染する。	①めん羊の潜伏期は 30～72 時間 ②発熱、嘔吐、出血性下痢を示し高い死亡率 ③妊娠めん羊の流産 ④山羊はめん羊と同症状、牛は流産のみで他の症状なし。	①発熱極期の全血（冷蔵）、肝臓、脾臓、脳（冷蔵または冷凍） ②ペア血清（冷蔵または冷凍） ③ホルマリン固定臓器
海7 馬ピロプラズマ病 〔法〕	① 海13 トリパノソーマ病 ② 144 馬伝染性貧血 ③ 栄養障害 ④ 中毒	①放牧中の感染が疑われる。 ②媒介ダニの活動する春～夏の5～8月に発生 ③馬から馬への直接伝播がない。	①間歇熱 ②黄疸 ③貧血 ④血色素尿 ⑤ときに腎不全、肺水腫を併発し死亡する。	①抗凝固剤入り血液 ②血清
海8 アフリカ馬疫 〔法〕	① 海15 馬ウイルス性動脈炎 ② 144 馬伝染性貧血 ③ 海7 馬ピロプラズマ病 ④ 142 炭疽	①馬、ロバ、ラバが感染、発病 ②犬、ラクダも感染 ②吸血昆虫（ヌカカまたは蚊） ③馬の死亡率は高い（90%以上）	<肺型> ①高熱 ②呼吸困難 ③激しい発咳 ④鼻汁漏出 <心臓型> ①発熱 ②頭部（側頭、眼瞼、口唇）、胸部の浮腫 <混合型> 肺型、浮腫型の混合 <発熱型> ①弛張熱 ②シマウマ、ロバでみられる。症状は軽度。	①抗凝固剤加血液 ②脾臓、脳、肺、リンパ節、肝臓、腎臓などの臓器 ③血清 ④ホルマリン固定臓器
海9 小反芻獣疫 〔法〕	① 海1 牛疫 ② 163 ブルータング ③ 海2 口蹄疫 ④ 168 伝染性膿疱性皮膚炎	①めん羊、山羊、レイヨウが感染・発病 ②アフリカ、中近東、南アジアの広域に発生 ③分泌液、排泄物を感染源とする接触感染	①潜伏期 4～5 日 ②めん羊より山羊の感受性が高い。 ③牛、豚は感染するが発病しない。 ④発熱、食欲不振、鼻鏡の乾燥 ⑤口、鼻粘膜の充血、び爛、咳、下痢、削瘦 ⑥急性例は 4～7 日で、亜急性は 2～7 週で死亡。希に回復 ⑦肺の赤色化、消化管粘膜の出血性病変がみられる。	①眼、鼻、唾液、直腸などの分泌液やぬぐい液 ②抗凝固剤加血液 ③血清 ④ホルマリン固定臓器（腸間膜および肺門リンパ節、脾臓、小腸、大腸、肺など）