

主な農薬とその中毒症状

農 薬	中 毒 症 状
有機リン剤	運動失調、嘔吐、流涎、発汗、縮瞳、全身痙攣、肺水腫
カーバメート剤	有機リン剤と同様の症状だが、発症および回復が早い。
ピレスロイド剤	運動失調、筋の痙攣、流涎、間代性痙攣、呼吸困難
カルタップ剤、チオシクロラム剤、ベンズルタップ剤	嘔吐、流涎、間代性あるいは強直性痙攣、呼吸困難、散瞳
硫酸ニコチン	嘔吐、下痢、振戦、痙攣、呼吸困難
クロロニコチニル剤 (ネオニコチノイド)	頻脈、血圧上昇、嘔吐、痙攣
有機塩素剤(殺虫剤)	嘔吐、不安、興奮、てんかん様痙攣、呼吸抑制
クロルピクリン剤	嘔吐、喘息様発作、振戦、運動失調、てんかん様発作、皮膚のび爛・水疱、呼吸困難、肺水腫
臭化メチル剤、D-D剤、EDB剤	嘔吐、呼吸困難、チアノーゼ、眼球振盪、四肢の痙攣、ショック
ジチオカーバメート剤	皮膚の発疹・掻痒感、結膜炎、血尿
無機銅塩剤	嘔吐、下痢、黄疸、ヘモグロビン血症、血圧低下、黒色便
有機ヒ素剤	嘔吐、呼吸および便のニンニク臭、血便、痙攣、慢性中毒では脱毛、鼻中隔穿孔、貧血、ヘモグロビン尿
ジクワット剤、パラコート剤	粘膜の炎症、ショック、意識障害、乏尿、黄疸、呼吸困難、肺水腫
アニリン系除草剤	嘔吐、下痢、メヘモグロビン血症
アミノ酸系除草剤	嘔吐、下痢、代謝性アシドーシス、血圧低下、痙攣、意識障害
クマリン系殺鼠剤	出血傾向(結膜下、鼻、歯肉、消化管等の出血、血尿、出血性ショック)
モノフルオロ酢酸ナトリウム剤	不安、興奮、嘔吐、痙攣、心不全
リン化亜鉛剤	嘔吐、疝痛、昏睡、ショック、低カルシウム血症、代謝性アシドーシス
硫酸タリウム	嘔吐、下痢、口内炎、痙攣

参考文献

・家畜中毒診断オンラインマニュアル(<http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poisoning/manual/>)