

ブロッコリー



主な加害種：ヒヨドリ、カモ類

鳥ではヒヨドリとカモ類（カルガモ、ヒドリガモなど）が、冬季にブロッコリーの葉を食害する。昆虫による食害と間違えやすいが、ヒヨドリの食痕はギザギザであるところで区別できる。カモ類の場合は、扁平な嘴でちぎるように食べるため、食べられた葉の先端が粗い切れ込み状になる。



加害種：ヒヨドリ

食痕が嘴でちぎり取ったような形状であり、昆虫による食害ではない。ヒヨドリは花蕾は食べずに葉を食べることが多い。

撮影：吉田



加害種：カモ類

カモ類は扁平な嘴で葉をちぎるように食べるため、食べられた葉の先端が粗い切れ込み状になる。花蕾は食べず、葉を食べる。

撮影：益子



加害種：カモ類

生育初期の食害も見られる。この段階で食害されると、生育が遅れるなど被害が大きくなってしまふ。

撮影：益子



カルガモ

ヒドリガモ

加害種：カルガモ、ヒドリガモ

葉をついばんで食べる様子。花蕾ではなく葉を食べ、柔らかい若葉が食べられやすい。

提供：徳島県 農林水産部 鳥獣対策・ふるさと創造課